

Erratum

cijferboek 'Hart en vaatziekten in Nederland 2008, cijfers over ziekte en sterfte'.

Hoofdstuk 1

1.1 Sterfte

In Nederland overleden in 2007 meer vrouwen dan mannen aan de gevolgen van een hart- of vaatziekte (tabel 1.1), namelijk 21.963 vrouwen en 19.662 mannen (gemiddeld 59 vrouwen en 54 mannen per dag).

Tabel 1.2b

Doodsoorzaken in Nederland, absolute aantallen en percentages () in 2007 naar leeftijd.

Mannen

Doodsoorzaak ¹	0-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Hart- en vaatziekten	473 (16)	351 (26)	550 (27)	917 (25)	1.262 (26)	1.670 (28)	2.383 (29)	3.388 (32)	3.893 (35)	4.775 (35)
Kwaadaardige nieuwvormingen	499 (17)	460 (33)	836 (40)	1.602 (45)	2.394 (49)	2.833 (47)	3.441 (43)	3.870 (36)	3.213 (28)	2.553 (19)
Ziekten van de ademhalingsorganen	78 (3)	39 (3)	66 (3)	176 (5)	251 (5)	416 (7)	761 (9)	1.301 (12)	1.675 (15)	2.335 (17)
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging	939 (32)	214 (16)	207 (10)	212 (6)	160 (3)	140 (2)	159 (2)	202 (2)	275 (2)	425 (3)
Overige doodsoorzaken	974 (32)	181 (22)	262 (20)	404 (19)	484 (17)	625 (16)	1.053 (17)	1.996 (18)	3.558 (20)	10.274 (26)
Alle doodsoorzaken	2.963 (100)	1.369 (100)	2.075 (100)	3.597 (100)	4.910 (100)	6.041 (100)	8.084 (100)	10.733 (100)	11.373 (100)	13.652 (100)

¹ Voor de precieze omschrijving en ICD-10 codes van deze groepen wordt verwezen naar bijlage B.

Bron: CBS.

De rood aangegeven cijfers ontbreken in het cijferboek 'Hart en vaatziekten in Nederland 2008, cijfers over ziekte en sterfte'.

Tabel 1.4

Aantal sterfgevallen (%)* aan hart- en vaatziekten (HVZ), ischemische hartziekten (IHZ) en beroerte (CVA) naar leeftijd en geslacht in Nederland in 2007.

Leeftijd (in jaren)	Vrouwen			Mannen		
	HVZ (%)	IHZ (%)	CVA (%)	HVZ (%)	IHZ (%)	CVA (%)
0-44	278 (1)	51 (1)	75 (1)	473 (2)	141 (2)	54 (1)
45-49	183 (1)	40 (1)	59 (1)	351 (2)	152 (2)	50 (1)
50-54	253 (1)	75 (1)	80 (1)	550 (3)	249 (4)	79 (2)
55-59	348 (2)	104 (2)	98 (2)	917 (5)	418 (6)	130 (3)
60-64	545 (2)	150 (3)	125 (2)	1.262 (6)	540 (8)	170 (5)
65-69	851 (4)	279 (5)	186 (3)	1.670 (8)	656 (10)	290 (8)
70-74	1.433 (7)	409 (8)	380 (7)	2.383 (12)	845 (13)	441 (12)
75-79	2.671 (12)	742 (15)	694 (12)	3.388 (17)	1.175 (17)	690 (18)
80-84	4.561 (21)	1.089 (21)	1.219 (21)	3.893 (20)	1.237 (18)	883 (24)
85-89	5.414 (24)	1.170 (23)	1.507 (27)	3.021 (15)	890 (13)	645 (17)
90-94	3.879 (18)	745 (15)	1.001 (17)	1.386 (8)	361 (5)	275 (7)
95+	1.547 (7)	263 (5)	360 (6)	368 (2)	95 (1)	77 (2)
Totaal	21.963 (100)	5.117 (100)	5.784 (100)	19.662 (100)	6.759 (100)	3.734 (100)


* Percentage binnen ziekte categorie

Bron: CBS.

De rood aangegeven cijfers zijn niet correct weergegeven in het cijferboek 'Hart en vaatziekten in Nederland 2008, cijfers over ziekte en sterfte'.

Figuur 1.5

Aantal ziekenhuisopnamen aan hart- en vaatziekten naar geslacht in Nederland in 2007



Het rood aangegeven cijfer is niet correct weergegeven in het cijferboek 'Hart en vaatziekten in Nederland 2008, cijfers over ziekte en sterfte'.

Capita Selecta

Menopauze en hart- en vaatziekten

8.7 Samenvatting

De term menopauze wordt gedefinieerd als het permanent stoppen van de menstruatie als gevolg van het verlies van activiteit van de eierstokken. De gemiddelde leeftijd waarop de natuurlijke menopauze bij Nederlandse vrouwen optreedt ligt tussen de 50 en 51 jaar. In Nederland zijn er ongeveer 3,5 miljoen vrouwen in de postmenopauzale fase, wat inhoudt dat deze vrouwen niet meer menstrueren.

Het rood aangegeven cijfer is niet correct weergegeven in het cijferboek 'Hart en vaatziekten in Nederland 2008, cijfers over ziekte en sterfte'.